

Het Medikinet® assortiment

Precies de individuele dosering die nodig is

Verkorte productinformatie Medikinet® CR

Samenstelling: Capsules met gereguleerde afgifte van 10,20,30 en 40 mg Methylfenidaat hydrochloride.

Indicaties: Medikinet® CR is geïndiceerd als onderdeel van een uitgebreid behandelingsprogramma voor Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), bij kinderen ouder dan 6 jaar in gevallen waarin andere "remedial measures" alleen onvoldoende zijn gebleken. **Dosering:** Medikinet® CR dient 's ochtends tijdens of na het ontbijt ingenomen te worden. Bij therapie aanvang starten met een lage dosering Medikinet® 5 tot 10 mg. Vervolgens de dagdosering wekelijks ophogen met stappen van 5-10 mg tot het gewenste therapeutisch effect is bereikt. De maximale dosering is 60 mg per dag. **Contra-indicaties:** Medikinet®CR dient niet te worden gebruikt door patiënten met een bekende overgevoeligheid voor methylfenidaat of voor een van de hulpstoffen, bij uitgesproken angst, spanning of opwinding aangezien dit geneesmiddel deze symptomen kan verergeren, bij patiënten met glaucoom, hyperthyroïdie, thyrotoxicose. Patiënten met ernstige angina pectoris, ernstige hypertensie, hartfalen en patiënten met een hartinfarct. Patiënten met ernstige depressie, psychotische symptomen, psychopathische persoonlijkheidsstructuur, agressie of suïcidale neigingen dient dit product niet te worden voorgeschreven aangezien Medikinet® CR deze aandoeningen kan verergeren. Medikinet dient ook niet te worden gebruikt bij patiënten met een bekende drugsverslaving of alcoholisme. Medikinet kan ook niet worden gebruikt bij gelijktijdige behandeling met niet selectieve MAO remmers of binnen 14 dagen na het staken van deze geneesmiddelen, omdat een hypertensie crisis of hyperthermie kan optreden. Medikinet® CR dient niet te worden gebruikt bij patiënten met motorische tics, tics bij broers of zussen of wanneer de diagnose Tourette's Syndroom in de familie voorkomt. Medikinet®CR niet gebruiken tijdens de zwangerschap en bij an-aciditeit van de maag in de anamnese of bij gelijktijdig gebruik met H2-receptorblokkerende stoffen of met antacida. Waarschuwingen en voorzorgen: Medikinet®CR dient niet te worden gebruikt bij kinderen jonger dan 6 jaar, bij de behandeling van ernstige exogene of endogene depressie, voorzichtig te worden gebruikt bij patiënten met ernstige depressie of met zelfmoord gedachten - of daden. Bij patiënten met epilepsie kan de drempelwaarde van conclusies worden verlaagd. **Bijwerkingen:** Zeer vaak; slapeloosheid en nervositeit. Vaak: arritmie, hartkloppingen, tachycardie, buikpijn, misselijkheid, overgeven, droge mond, verandering in bloeddruk en hartslag (meestal verhoging), verminderde eetlust, verminderde gewichtstoename bij langdurig gebruik, arthralgie, duizeligheid, slaperigheid, dyskinesie, hoofdpijn, hyperactiviteit, abnormaal gedrag, agressie, onrust, anorexie, angst, depressie, geïrriteerdheid, verlies van hoofdhaar, jeuk, huiduitslag en jeuk. Deze bijwerkingen zijn over het algemeen mild van aard en verdwijnen meestal na de eerste dagen van de behandeling. **Afleverstatus:** UR. **Vergoeding en prijzen:** Medikinet® CR is opgenomen in het GVS waarin gedeeltelijke vergoeding is vastgelegd voor een equivalente hoeveelheid kortwerkend methylfenidaat. Voor de exacte prijzen en vergoeding wordt verwezen naar de Z-Index Taxe en de polisvoorwaarde van de aanvullende zorgverzekering. Raadpleeg voor de volledige productinformatie de 1B tekst (december 2006). **Registratiehouder:** Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhlweg 37, 58638 Iserlohn, Duitsland. (Oktober 2007)



Eurocept BV | Trappans 5 | 1244 RL Ankeveen
tel: 035-528 83 77 | fax: 035-542 40 86
www.eurocept.nl | www.medikinet.nl

Medikinet^{CR}

Snel op peil, 8 uur werkzaam